정맥주사 IV.drip	주사제
독극물제제	전문의약품
	분류번호:2.9

불티온 5mg 구강붕해필름 (타다라필)

[성분 · 함량] 1 필름 중
타다라필(USP) 5mg
[성 상] 원형의 양면이 소면의 구강붕해필름
[효능 · 효과] 발기력 장애(erectile dysfunction) 치료
이 약은 효과적이었던 경우에(clinical efficacious) 발기력 장애의 치료를 위해 1일 1회 저녁에 약한 사용을 그 적용증으로 하여 준다.
[용법 · 용량] 경구 투여용.
1. 성인 성인대상 시험
이 시험에서는 연령은 사용되지않아 특히 고령자 가장많은 환자에게에 한정되는 용량은 최대 1일 1회 5mg으로 하여야 성인 시간의 복용하는 것이 권장되어 이 약은 발기력이 약한 사람에게 적절한 수준에 이를 때까지 일시적 또는 계속적 일정 기간에 사용하는 것이 적절하다고 하여 제한하여야 한다.
2. 특수 집단
· 고령자에게 사용
고령 환자에게 용량 조절 (dosage adjustment)을 필요로 하지 않는다.
· 신기능 장애가 있는 상태에서 사용
경증 내지 중등도의 신장애가 있는 환자에서 용량조절을 필요로 하지 않는다. 단한 번째에 한정해서 이 약을 1회 용량은 권장되지 않는다(시험에 주의사항 참조). 그러나 이 약을 1일 1회 용량은 권장되지 않는다.
· 간기능 장애가 있는 상태에서 사용
· 경증 간기능 장애가 있는 환자에 대한 이 약의 용량은 평가되지 않았다. 그러므로, 제한적 경증, 장애는 신중하게 계획적 유의깊은(careful) 사용을 권장하여 한다.
· 만성 중등도 간기능 장애가 있는 환자에 대한 이 약의 용량은 평가되지 않았다. 그러므로, 제한적 경증, 장애는 신중하게 계획적 유의깊은(careful)사용을 권장하여 한다.
· 간기능 장애가 있는 상태에서 사용하지 않는 것이 권장된다.
· 신장 장애가 있는 상태에서 사용
· 신장 장애가 있는 상태에서 사용하지 않는 것이 권장된다.
[사용상의 주의사항]
1. 경고
· 고령 상태에서 사용
고령 환자에게 용량 조절 (dosage adjustment)을 필요로 하지 않는다.
· 간기능 장애가 있는 상태에서 사용
경증 내지 중등도의 신장애가 있는 환자에서 용량조절을 필요로 하지 않는다. 단한 번째에 한정해서 이 약을 1회 용량은 권장되지 않는다(시험에 주의사항 참조). 그러나 이 약을 1일 1회 용량은 권장되지 않는다.
· 간기능 장애가 있는 상태에서 사용하지 않는 것이 권장된다.
· 신기능 장애가 있는 상태에서 사용하지 않는 것이 권장된다.
[사용상의 주의사항]
1. 경고
· 이 시험에 한해서는 주의사항 참조 (Warnings/Precautions)에 기술된 이외에 특별한 주의사항 사항은 없다.
· 심혈관계 이상(cardiovascular disease) 이상을 가지고 있는 환자에게 이 약을 투여하기 전에 이 약의 잠재적인 위험성을 고려하여야 한다. 성관계는 심혈관 기능 장애에 의해 영향을 받을 수 있다. 이 약은 심혈관계 이상을 가지고 있는 환자에게 이 약을 투여하기 전에 이 약의 잠재적인 위험성을 고려하여야 한다. 성관계는 심혈관 기능 장애에 의해 영향을 받을 수 있다. 이 약은 심혈관계 이상을 가지고 있는 환자에게 이 약을 투여하기 전에 이 약의 잠재적인 위험성을 고려하여야 한다. 성관계는 심혈관 기능 장애에 의해 영향을 받을 수 있다. 이 약은 심혈관계 이상을 가지고 있는 환자에게 이 약을 투여하기 전에 이 약의 잠재적인 위험성을 고려하여야 한다. 성관계는 심혈관 기능 장애에 의해 영향을 받을 수 있다.
· 심혈관계 이상 (cardiovascular disease)을 가지고 있는 환자에게 이 약을 투여하기 전에 이 약의 잠재적인 위험성을 고려하여야 한다. 성관계는 심혈관 기능 장애에 의해 영향을 받을 수 있다. 이 약은 심혈관계 이상을 가지고 있는 환자에게 이 약을 투여하기 전에 이 약의 잠재적인 위험성을 고려하여야 한다. 성관계는 심혈관 기능 장애에 의해 영향을 받을 수 있다. 이 약은 심혈관계 이상을 가지고 있는 환자에게 이 약을 투여하기 전에 이 약의 잠재적인 위험성을 고려하여야 한다. 성관계는 심혈관 기능 장애에 의해 영향을 받을 수 있다.
· 심혈관계 이상 (cardiovascular disease)을 가지고 있는 환자에게 이 약을 투여하기 전에 이 약의 잠재적인 위험성을 고려하여야 한다. 성관계는 심혈관 기능 장애에 의해 영향을 받을 수 있다. 이 약은 심혈관계 이상