

진해 · 거담제

세브론 캡슐

(Acetylcysteine)

세브론 캡슐은 N-acetyl-L-cysteine 성분으로 이루어진 호흡기 점액 용해성 거담제로서 기도 및 폐 호흡기에서 점액 성 객담을 이루는 disulfide bond linkage (-S-S-결합)를 직접 개열 용해시켜 -SH 기로 치환하여 담의 배출을 용이하게 할 뿐만 아니라 분비 조절작용을 통한 기도 점막 기능 정상화 작용을 도모하는 호흡기 점액 용해성 거담 치료제입니다.

【성분 · 함량】 1캡슐 중

아세틸시스테인(USP).....200mg

첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색3호

【성 상】 흰색의 내용물이 든 (상부)청색, (하부)흰색의 경질캡슐제

【효능 · 효과】

1. 주 효능 · 효과

1) 다음의 질환에서의 객담배출곤란 : 급 · 만성 기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증

2) 인 · 후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성 중이염

【약리작용 및 특징】

1. 세브론 캡슐은 Mucoprotein 분해작용이 우수합니다.

N-Acetyl-L-cysteine은 객담 등 점액성 질환을 일으키는 주요인인 Mucoprotein의 -S-S- 구조를 분해, -SH 그룹으로 치환시킴으로서 점조성 · 농성 호흡기 분비물을 신속하게 분해시켜 배출을 용이하게 해 줍니다.

2. 세브론 캡슐은 점액분비 조절 작용이 뛰어납니다.

기도 점막의 점도를 낮추어 점액의 분비운동 능력을 증가시킬 뿐만 아니라, 기도 순환작용 강화를 통해 점액 분비 조절 작용을 나타냅니다.

3. 세브론 캡슐은 호흡기 점막 기능 정상화를 촉진합니다.

N-Acetyl-L-cysteine은 호흡기 점막의 섬모운동을 촉진시키며, 객담배출을 용이하게 함으로써 기도를 포함한 호흡기의 점액-섬모계 방어기능을 정상화시켜 줍니다.

4. 세브론 캡슐은 안전성이 뛰어납니다.

N-Acetyl-L-cysteine의 -SH 그룹은 체내에서 강력한 환원제로 작용하여 항산화작용을 나타낼 뿐만 아니라 체내 항산화 성분인 Glutathione 생합성에 이용되기도 합니다. 또한 Acetaminophen 과량투여시 해독제로도 쓰이는 등 그 안전성이 널리 입증된 제제입니다.

【용법 · 용량】

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여 하십시오.

1. 급성 질환 - 성인 : 1회 200mg 1일 3회 소아 : 6~14세 1회 200mg 1일 2회

2. 만성 질환 - 성인 : 1회 200mg 1일 2회 소아 : 6~14세 1회 100mg 1일 3회

3. 낭성섬유증 - 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg 1일 4회

연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성 질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약에 과민증 환자 2) 위 · 십이지장궤양 환자

3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. : 신생아(중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 마십시오.)

4. 이상반응

1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴 쓰림, 설사 등이 나타날 수 있습니다.

2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지 경련(특히 천식 환자)등이 나타날 수 있습니다.

3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있습니다.

5. 상호작용

경구용 항생물질(아목시실린, 세프록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있습니다.(적어도 2시간의 간격을 두고 투여하십시오.)

6. 임부에 대한 투여 : 임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여하십시오.

7. 수유부에 대한 투여 : 이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약물이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여하십시오.

8. 적용상의 주의 : 이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 합니다.

9. 1일 허용량 제한 : 아스파탐 함량을 WHO 권장량(40mg/kg/1일) 이하로 조정(가능한 한 최소량 사용)하십시오.

60kg 성인 : 1일 최대 복용량 2.4g

【포장단위】 30캡슐, 500캡슐

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

* 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.

* 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → “정보마당” → “의약품 정보”를 참조하십시오.

<이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.>

최종작성일자 : 2011. 05. 31



마음까지 건강하게
(주)서울제약

경기도 시흥시 청왕동 1248-8번지
문의전화 : (080)780-1931